



Bilancio Fitosanitario

Vite Nord Fitofagi

5 dicembre 2019

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Rita Bonfanti – Sandro Dallou

☐ 0165275405-5382


Superficie coltivata

Regione	ha	Trend
Valle d'Aosta	Circa 500	In aumento


Torino

- Presenti Tignola e Tignoletta non in tutte le zone viticole
- Le due annate sono state poco problematiche
- Le catture sono poco importanti (vedi grafico)
- 2 generazioni all'anno. Nel 2019 le catture sono state anticipate rispetto al 2018
- La criticità principale è nel monitoraggio, la presenza di adulti è nulla nelle zone dove si effettua la confusione sessuale e altrove i picchi di presenza non sono ben definiti


**Tignoledella vite- ARNAD -Bonin C.
2018**




**Tignoledella vite- ARNAD -Bonin C.
2019**




**Tignole della vite- Pont Saint Martin
2018**



**Tignole della vite- Pont Saint Martin
2019**






Nessuna segnalazione



Scaphoideus titanus- Punti di rilevamento ANNO 2018



Scaphoideus titanus- Punti di rilevamento ANNO 2019



- Il numero dei trattamenti obbligatori nelle zone focolaio e consigliati nelle zone limitrofe è di 2 interventi. Può essere ridotto a 1 dove è dimostrato che dopo il 1° intervento non ci sono più catture.
- Si consiglia 1 primo intervento in post fioritura con Indoxacarb o Acetamiprid e un secondo 20-30 giorni dopo con Flupyradifurone oppure Clorpirifos-metil. (Qualcuno usa il piretro naturale anche in difesa integrata)
- Presenza di vigneti incolti e di viti abbandonate isolate
- In agricoltura bio si consigliano 3 interventi con piretro naturale
I sali potassici degli acidi grassi non vengono usati

- *Cimice asiatica*: per ora non segnalati danni
- *Drosophyla suzukii*: nei vigneti monitorati negli ultimi 2 anni poche catture, qualche uovo su acino, ma che il più delle volte non si sviluppa. Non sono consigliati interventi chimici, ma lotta agronomica. Qualche agricoltore in fase di invaiatura preferisce, in ogni caso, eseguire un acetamiprid.
- *Ragnetto rosso* e *ragnetto giallo*: si stanno ripresentando, in alcuni vigneti è stato necessario intervenire
- *Nottue*: danni molto localizzati, si consiglia lotta meccanica (coni rovesciati, colla, raccolta manuale).

Patogeni

Riportare per ciascun organismo
un'indicazione di sintesi

Conclusioni

sull'andamento delle due annate utilizzando le faccine sotto-riportate



	2018	2019
Tignole		
Scafoideo		
Cimice asiatica		
Drosophyla suzukii		
Ragnetto rosso		
Ragnetto giallo		