



Bilancio Fitosanitario

Vite
Nord
Fitofagi

2020 - 2021

Regione autonoma Valle d'Aosta

Relatori

Rita Bonfanti


- Email: r.bonfanti@regione.vda.it -
- Numero di telefono 0165 - 275405

Superficie coltivata

Regione: _____	ha	Trend
Vite	Circa 500	costante


2 dicembre 2021

- Tignola e Tignoletta sono presenti solo in alcune zone viticole;
- Le due annate sono state poco problematiche;
- Le catture sono poco importanti;
- 2 generazioni all'anno. Il volo della prima generazione è iniziato dopo la metà di aprile in entrambe le annate (che non viene trattato);
- Seconda generazione: avviso per trattamento 20 luglio 2020 e 23 luglio 2021 deciso in base alla ripresa catture;
- Risulta critico definire esattamente la data d'inizio dei voli e per lo scarso numero di catture.




- Le misure adottate dalla Valla d'Aosta prevedono 2 trattamenti obbligatori nelle zone focolaio. Tali interventi sono fortemente consigliati nelle zone indenni. Gli interventi possono essere ridotti a 1 dove è dimostrato con monitoraggi che le catture si azzerano dopo il primo trattamento;
- Si consiglia 1 primo intervento in post fioritura con Acetamiprid e un secondo 20-30 giorni dopo con Flupyradifurone. (Qualcuno usa il piretro naturale anche in difesa integrata);
- Problemi legati alla presenza di vigneti incolti e di viti abbandonate isolate che sono oggetto di estirpo obbligatorio qualora individuati;
- In agricoltura bio si consigliano 3 interventi con piretro naturale. Diffuso anche l'impiego di sali potassici degli acidi grassi e l'olio essenziale di arancio dolce;
- Avvisi diramati dal servizio fitosanitario: nel 2020 8 giugno e 3 luglio - nel 2021 il 16 giugno e il 7 luglio.

Scaphoideus titanus- Punti di rilevamento
ANNO 2020



Scaphoideus titanus- Punti di rilevamento
ANNO 2021



Totale delle catture di adulti
Densità delle ninfe per pianta (la soglia di intervento nelle zone focolaio è di 0,02)

- *Cimice asiatica*: presente con popolazioni insignificanti - non sono mai stati segnalati danni;
- *Drosophila suzukii*: Si consiglia inizialmente la lotta agronomica e la posa di trappole alimentari. Nel 2020 non sono stati necessari interventi chimici. Nel 2021 la situazione è stata analoga, solo un viticoltore ha trattato per superamento soglia di 2 uova/50 acini.
- Ragnetto rosso e ragnetto giallo: si stanno ripresentando, nel 2020 in alcuni vigneti è stato necessario intervenire con acaricidi;
- Nottue: danni molto localizzati, si consiglia lotta meccanica (coni rovesciati, colla, raccolta manuale).

sull'andamento delle due annate utilizzando le faccine sotto-riportate



	2020	2021
Tignole		
Scafoideo		
Cimice asiatica		
Drosphila suzukii		
Ragnetto rosso		
Ragnetto giallo		